

脳血管疾患・心疾患の年間死者数はがんと同水準
「4人に1人」が動脈硬化を一因とする疾患で亡くなっています。

運動
不足

喫煙

肥満

高血圧

偏食



脳梗塞・心筋梗塞の 将来リスクお調べします!


脳梗塞

寝たきりの原因にもなる疾患。
「3人に1人」が死亡か後遺症に



心筋梗塞

突然死の危険のある疾患。
年間「約15万人」が発症。



新しい検査で
発症危険度を
チェック!


血液検査でわかる脳梗塞・心筋梗塞の可能性

LOX-index® (ロックス・インデックス)

検査の 特徴

◎動脈硬化の原因物質を測定

血液中に隠れている動脈硬化の
原因物質の量を調べる



◎採血(約2ml)で検査可能

◎脳梗塞・心筋梗塞の 将来の発病リスクを予測

検査では血液中の酸化した超悪玉コレステロール【酸化変性LDL】と、それを血管の壁に取り込んで動脈硬化を進ませる【LOX-1】というたんぱく質を測定します。検査によって得た解析データを過去の臨床データと照らし合わせ、動脈硬化の進行から将来の脳梗塞や心筋梗塞の発症危険度(リスク)を予測いたします。

Q&A

よくあるご質問

このような方にお勧めします

- 肥満気味である
 - 高血圧、脂質異常症、糖尿病などの持病がある
 - 脂っこい食事や
塩辛い食べ物をよく食べる
 - たばこを吸っている
もしくは吸っていた
 - 定期的に運動をしていない




検査結果は、詳細なレポートでご報告致します。

発症リスクのレベルを
分かりやすくグラフで記載。

過去の検査結果からの
推移も一覧できる解説付き。

生活習慣改善のための
アドバイス別冊子つき。



検査費用：13,200円（税込）

◆予約に関するお問い合わせ



地域医療支援病院 **赤磐医師会病院**

TEL:086-955-6688

月～金曜日 午後1時30分～午後5時

- ※ 妊娠中は受診を控えてください。（妊娠中、出産後3ヶ月以内の方は検査数値が高く出る傾向があります。）
 - ※ リウマチ、熱がある場合は、検査数値が高く出る可能性がございます。
 - ※ 脂質異常症治療薬、抗血小板薬、降圧薬を服用されている方は、検査数値が低く出る可能性がございます。